

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ SĂ SE RÂSPÂNDEASCĂ ÎN EUROPA: FIȚI ATENȚI LA SEMNELE EI ȘI ANUNȚAȚI MEDICUL VETERINAR!

Ce este pestul porcinei africane?

Pesta porcinei africane este o boală a porcilor domestice și sălbatici, mortală pentru porci care se imbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin singură de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele bolnave.

Cine cauzează pestul porcinei africane?

Pesta porcinei africane este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți europeni de toate vîrstele, indiferent de gen.

Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?

Nu!

A mai evoluat boala în România?

Până în prezent, virusul nu a pătruns pe teritoriul României. Virusul poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultățile de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului, de aceea, teritoriul țării trebuie păstrat indemn.

Unde evoluază boala în prezent în Europa?

În Uniunea Europeană în Lituanie, Letonia, Estonia, Polonia și Italia (insula) Sardinia, în Federația Rusă, Ucraina, Belarus, foarte aproape de granița cu state ale Uniunii Europene.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Cum arată un porc bolnav de pestul porcinei africane?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.



mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de cură;

temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;

roșeaș sau învinjeire a pielii, a marginilor urechilor, a vîrfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;

lipse poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, care pot apărea cu 24-48 ore înaintea morții;

vomitori, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi;

Cum se transmite virusul?

în contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin rănirea porcilor cu resturi de la bucatărie, când originea cărnii de porc folosită gătit nu este cunoscută;

dinti vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.

toate secrețiile, excrețiile, fluidele, țesuturile provenite de la animalele bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit imbolnăvirii și au recuperat;

mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc și multe luni, iar în carne congelată mai mulți ani. Este cel mai rezistent virus, și ce-l face foarte periculos.



Pot fi animalele vaccinate împotriva pestei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei bolii! Măsurile de prevenire (igienă alimentară și a exploatațiilor, mișcările animalelor și măsurile de control aplicate de autoritățile împuternicite sunt singurele metode care pot începe să fie depărtate.

Există tratament pentru această boală?

NU!

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestul porcinei africane?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul meu;
- izolez imediat animalul bolnav, sau cadavrul de alte animale fără semne de boală și îl prezint medicului veterinar,
- mă oblig să nu arunc cadavrul animalului în locuri neamenajate.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestul porcinei africane?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
- toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în condiții de maximă securitate astfel încât să se impiedice orice transmitere a bolii;
- circulația animalelor va fi pusă sub restricții în perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile aflate în perimetru de restricții vor fi ținute sub observație;
- exploatațiile infectate vor fi dezinfecțiate, dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când condițiile sunt întrunate.

Pentru a vă proteja porcii de această boală vă recomandăm să respectați următoarele măsuri:

- Nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțămintea și hainele cu care ati umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneti o tăvăță cu pres sau burete îmbibat cu o soluție slabă de sodă caustică;
- Creșteți porcii doar în spații îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- Nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/spălătură provenite de la carne de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț sub nici o formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- Nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;
- Nu cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotală) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- Nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

Nu vă temeți de penalizări ale guvernului, contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea indemnizației țării!

Telefonul DSVSA la care se va anunța orice suspiciune este:

0232267501

0232267502



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Material informativ cu privire la pesta porcină africană destinat crescătorilor de porcine din exploatațiile non-profesionale, în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le dețin

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbaticice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

- a. nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să punеji o tăviță cu paie îmbibată cu o soluție slabă de sodă caustică;
- b. creșteți porcii doar în spații îngădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- c. nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carne de porc gătită în familie; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- d. nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;
- e. nu cumpărați porcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuernicit;
- f. nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată ($40,5 - 42^{\circ}\text{C}$) și stare febrilă;
- roșeață sau învinetire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunțați imediat medicul veterinar împuernicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul dvs. la numărul de telefon

Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor.

Ce vor face serviciile veterinară în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!