

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii
TAPHRINA DEFORMANS (BĂȘICAREA FRUNZELOR DE PIERSIC)
care poate cauza pierderi importante la culturile

piersic

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului 3
numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

prevenirea infecțiilor

Folosiți unul din produsele:

1. Score 250 EC = 0,02% Produsele recomandate sunt eficiente
2. Merpan 50 WP = 0,25% și pentru alte boli.
3. alte produse omologate

Perioada optimă de tratament **scuturarea florilor**

Alte recomandări:

În livezile cu rezervă biologică de dăunători tratamentul se va complexa cu un insecticid specific.

Fermierii au obligația evidențierii tratamentelor fitosanitare în registrul de evidență a tratamentelor, după modelul:

Data efectuării tratament, zi, luna, an	Cultura locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabilă de efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data docum. prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafata, ha	Cantități utilizate(kg,l)			

în caz contrar fiind pasibili de sancțiuni (8000 – 10000 lei) conform HG 1230/2012 de aplicare a regulamentului CE 1107/2009.

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

Laborator prognoză și avertizare