

## BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii  
PHOMOPSIS HELIANTHI (PĂTAREA BRUNĂ ȘI FRÂNGEREA TULPINILOR)  
care poate cauza pierderi importante la culturile  
floarea soarelui

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

prevenirea infecțiilor

Folosiți unul din produsele:

1. Mirage 45 EC = 1,0 l/ha Eficace și pentru putregaiul alb,
2. Topsin 70 WDG = 1,0 kg/ha putregaiul cenușiu și alte boli
3. alte produse omologate

Perioada optimă de tratament 6-8 perechi de frunze până la apariția butonului floral

Alte recomandări:

Al doilea tratament se va aplica de la diferențierea netă a capitulului până la apariția florilor ligulate, iar al treilea tratament se va aplica la 10-15 zile după sfârșitul înfloritului.

***Fermierii au obligația evidențierii tratamentelor fitosanitare în registrul de evidență a tratamentelor, după modelul:***

Data efectuării tratament, zi, luna, an	Cultura locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele pers. responsabilă de efectuarea tratamentului, semnatura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data docum. prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza Omologată /doza folosită	Suprafața, ha			

***în caz contrar fiind pasibili de sancțiuni ( 8000 – 10000 lei ) conform HG 1230/2012 de aplicare a regulamentului CE 1107/2009.***

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de uz fitosanitar, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

Laborator Prognoză – Avertizare

