



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR IAȘI

Str.Dumbrava Roșie nr.3

Loc. Iași, Jud. Iași

Telefon/Fax: 0232 272390

Nr.42/4.06.2018

BULETIN DE AVERTIZARE

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea bolii
PHOMOPSIS HELIANTHI (PĂTAREA BRUNĂ ȘI FRÂNGEREA TULPINILOR)
care poate cauza pierderi importante la culturile

floarea soarelui

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții:

prevenirea infecțiilor

Folosiți unul din produsele:

1. Bumper Super 490 EC = 0,8 l/ha Eficace și pentru putregaiul alb,
2. Tanos 50WG = 0,4 kg/ha putregaiul cenușiu și alte boli.
3. Pictor = 0,5 l/ha
4. alte produse omologate

Perioada optimă de tratament **6-8 perechi de frunze până la apariția butonului floral**

Alte recomandări:

Al doilea tratament se va aplica de la diferențierea netă a capitulului până la apariția florilor ligulate, iar al treilea tratament se va aplica la 10-15 zile după sfârșitul înfloritului.

La efectuarea tratamentelor fitosanitare se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și animalelor respectiv Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România.

Laborator Prognoză - Avertizare

