AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: **ofiasi@anfof.ro**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 38 din 16.06. 2022

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Plasmopara viticola - mana viței de vie

Mana afectează toate organele verzi ale viței de vie: frunze, lăstari,ciorchini și cârcei, inflorescențe, boabe. Frunzele pot fi atacate după ce ating o suprafață de 10-25 cm² și până ce îmbătrânesc, când manifestă rezistență sporită la mană. Pe frunze apar pete untdelemnii, circulare sau neregulate. În perioadele umede, pe partea inferioară a frunzelor, în zona petelor, apare un puf albicios, format din fructificațiile ciupercii. În timp petele se brunifică și se usucă. Spre toamnă, pe frunze pot să apară pete de 1-2 mm diametru, colțuroase, dând frunzelor aspect mozaicat. Pe timp umed, ciorchinii, inflorescențele și boabele mici atacate se acoperă cu puf albicios, apoi se necrozează și se usucă. Boabele mai dezvoltate, după atac, capătă o culoare vineție-murdară , se zbârcesc și se desprind mai ușor de pe pedicele. Transmiterea bolii peste iarnă se face prin frunzele mozaicate, căzute pe sol. Apariția bolii este favorizată de precipitații abundente, umiditate ridicată a aerului, temperaturi moderate, lipsa unei bune aerisiri cauzată de îmburuienare și neefectuarea la timp a lucrărilor de dirijat, copilit, cârnit.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în plantațiile viticole, postfloral, cu unul din produsele:

1. **Mikal Flash = 3,0 kg/ha**
2. **Armetil Cobre = 2,5 kg/ha**
3. **Folpan 80 WDG = 1,5 kg/ha**

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va complexa cu un fungicid compatibil, omologat pentru combaterea făinarii.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAŞI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: **ofiasi@anfof.ro**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 39 din 16.06. 2022

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Putregaiul cenușiu al strugurilor - Sclerotinia fuckeliana

Ciuperca Sclerotinia fuckeliana, cu forma conidiană cunoscută sub denumirea de Botrytis cinerea, este o ciupercă polifagă, saprofită și parazită.Ca parazit afectează vița de vie și numeroase alte plante cultivate sau spontane, iar ca saprofit contribuie la descompunerea resturilor vegetale și se poate dezvolta pe resturile coșulețelor florale rămase pe ciorchine după scuturare. Putregaiul cenușiu afectează frecvent strugurii, atacul fiind favorizat de umiditatea ridicată, persistența apei pe struguri sau când este afectată integritatea strugurilor. Leziunile ce se produc pe boabe și ciorchini, datorită înțepăturilor de insecte, grindinei, plesnirii boabelor, loviturilor mecanice sau altor cauze, favorizează atacuri foarte intense de putregai cenușiu, mai ales când se asociază și o umiditate ridicată.

Atacul cel mai cunoscut de viticultori apare toamna, pe struguri, după ce se acumulează suficient zahăr în celule. Boabele bolnave se înmoaie, pielița este brunificată , se desprinde ușor de pulpă și se acoperă cu un mucegai cenușiu format din fructificațiile ciupercii. Atacul de putregai cenușiu este mai frecvent la soiurile cu pielița subtire și așezare îndesată a boabelor pe ciorchine.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în plantațiile viticole (tratament de siguranță), postfloral, cu unul din produsele:

1. **Folpan 80 WDG = 1,5 kg/ha**
2. **Cantus = 1 -1,2 kg/ha**

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR IAŞI
Adresa: str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: **ofiasi@anfof.ro**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 40 din 16.06.2022

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

***Hyphantria cunea* - omida păroasă a dudului**

Omida păroasă a dudului este considerată ca unul din principalii dăunători ai pomilor, atacând peste 120 specii de plante. În țara noastră are două generații pe an.

Iernează în stadiul de crisalidă în diferite ascunzișuri, în crăpăturile scoarței, scorburi, sub streșinile clădirilor, în stratul superficial al solului, etc. Fluturii zboară seara și noaptea iar ziua stau scunși. Apariția lor este eșalonată pe o perioadă de până la o lună. Pentru pontă sunt preferați pomii sau arborii izolați, cu coroana bine aerisită și luminată. Ponta este depusă pe partea inferioară a frunzelor, iar o femelă poate depune până la 800 de ouă. La apariție, larvele formează cuiburi mici, din 2-3 frunze unite prin fire mătăsoase. După ce se hrănesc cu epiderma și parenchimul acestor frunze, cuprind în cuib, în mod treptat, frunze noi din apropiere. Asemenea cuiburi pot împânzi întreaga coroană a pomului. Atacul provoacă desfrunzirea partială sau totală a pomilor, ceea ce duce la pierderea recoltei și debilitarea pomilor.



Se recomandă combaterea dăunătorului, generatia I, în plantațiile pomicole și pe aliniamente, prin mijloace mecanice care constau în tăierea și distrugerea cuiburilor de omzi, operație ce se completează tratând chimic cu produsul

***Faster 10 EC= 0,02%** sau alte produse pentru protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.*

Se vor controla permanent plantaţiile pomicole şi se vor aplica măsurile recomandate.

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor !

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor).

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind eco-condiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermierii în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea