AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR ZONAL IAȘI-BOTOȘANI
OFICIUL FITOSANITAR IAȘI
Adresa:Str. Dumbrava Roșie nr. 3, Iași 700471

Tel.: +40 232 272 390
M.: +40 787 603 965
E-mail: **ofiasi@anfof.ro**

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 4 din 25.03.2026

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare:

Monilioza sâmburoaselor (Monilinia laxa și Monilinia fructigena)

Monilioza produsă de Monilinia laxa este una din cele mai grave boli ale speciilor pomicole sâmburoase: vișin, cireș, cais, prun și uneori piersic. Denumită putregaiul brun și mumifierea fructelor, atacul acestei ciuperci se manifestă mai ales în primăverile reci și ploioase, când ramurile cu frunze și flori se vestejesc în număr mare. Acest aspect parazitar mai poartă denumirea de ,,arsura moniliană". Fructele tinere sunt de asemenea parazitate. Atacurile de primavară sunt declanșate în masă de Monilinia laxa, în timp ce atacurile pe fructe din perioada vară-toamnă sunt declanșate în masă de Monilinia fructigena. Sensibilitatea maximă la atacul moniliozei este în perioada înfloritului și la maturarea fructelor. Agenții patogeni iernează sub formă de miceliu de rezistență în organele atacate, precum și sub formă de conidii. Pragul biologic al ciupercii Monilinia laxa este de aproximativ 4°C. Pe organele atacate se formează conidii care sunt luate de vânt, păsări, insecte, apă și infectează pomii, dacă aceștia sunt porniți în vegetație. Infecția se face în mod deosebit prin răni, însă și direct prin stigmat, pistil, petale, frunze și lăstari ierbacei. Timpul răcoros și ploios prelungește înfloritul și favorizează atacul moniliozei. Miceliul de infecție ajunge în flori și trece prin cozile acestora în scoarța ramurilor. Prezența mare în plantație a organelor atacate din anul precedent și primăvara răcoroasă și umedă poate indica un atac puternic de monilioză în primăvară. Atacurile de monilioză se pot confunda cu daunele produse de înghețuri târzii. Tăierile raționale de rărire și fructificare oferă o bună aerisire a coroanei și favorizează pătrunderea soluției de stropit la nivelul tuturor organelor.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la specii sâmburoase de pomi fructiferi, în fenofaza buton alb , cu produsul:

1. Merpan 80 WDG (Flo-Captan - a doua denumire comercială) - 2,0 kg/ha în 1000 L apă,

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena Ulea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iași

ALTE RECOMANDĂRI

- Respectați cu strictele normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ordinul comun nr. 45/1991al Ministerului Agriculturii și Alimentației; 15 b/3404/l991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor; precum și cu Protocolul nr.3242/12.10.2015 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania - Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu PPP.

- La realizarea amestecurilor se va verifica, cu mare atenție, compatibilitatea produselor utilizate,

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

- Registru de evidență a tratamentelor, se completează la zi în format letric sau electronic și se păstrează pentru o perioadă de cel puțin trei ani evidența produselor fitosanitare pe care le utilizează la nivelul fermei.

- Respectați prevederile Ord. nr. 297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. (www.anfdf.ro).

- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr,352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și misiunilor de sprijin pentru fermieri din România, cu modificările ulterioare.

- Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională dobândit prin instruire privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS https;//fits.anfdf.ro

- Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnica periodică a acestor echipamente

.

- Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați. eticheta oferind informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare, etc.

Coordonator Oficiul Fitosanitar Iași
Bișog Corneliu-Adrian

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ - ROMÂNIA - Oficiul Fitosanitar Iași